



STATION PORTOU-CHARENTES

03902 03003 00097 1090A 01/04/93-11h U BIBLIOTHEQUE NATIONALE REGIE DEPOT LEGAL PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE 58. RUE RICHELIEU

Bulletin nº 1 du 31 mars 1993

**75000 PARIS** 

STADES PHENOLOGIQUES: Le stade dominant est le stade "Gonflement" (02). Dans les situations les plus précoces, les bourgeons des coursons arrivent au stade "Bourgeons dans le cotons" (B = 03).

#### POUR L'ENSEMBLE DU VIGNOBLE

Le traitement à l'arsénite de soude à 1250 g/hl devient dangereux pour les bourgeons. Il est donc conseillé d'arrêter ce type de traitement. Il est déconseillé de passer à demi-dose car l'efficacité sur l'Esca n'est pas garantie est le risque de phytotoxicité subsiste. Pour lutter contre l'Excoriose, préférer les traitements au stade D (06) avec d'autres produits.

# PROBLEMES LIMITES A QUELQUES PARCELLES

### **NECROSE BACTERIENNE**

Par temps pluvieux, le traitement au stade B (03) avec une bouillie bordelaise à 2 % est important.

# VIGNES MERES DE PORTE-GREFFES OU GREFFONS

Détruire les oeufs de cicadelles de la Flavescence dorée avec des oléoparathions.

Si vous avez constaté en 1992 des dégâts de :

#### **COCHENILLES**

Les huiles jaunes et les oléoparathions amélioreront l'efficacité du traitement d'été en détruisant les formes hivernantes.

# ACARIOSE ET ERINOSE

Le soufre à 1600 g/hl est à appliquer au stade B (03) en mouillant bien.

Les huiles jaunes ne sont plus utilisables à partir du stade B (03). Les oléoparathions sont utilisables jusqu'au stade C (05).

Le dossier AVERTEL 1993 vous sera envoyé en Mai. Actuellement, référez-vous au dossier AVERTEL 1992 (pages C 2 à C 4).



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 13, Rte de la forêt - 86580 BIARD Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL CPPAP no. 1664 A.D. ISSN 0294 - 4693

